

→ Po buteliuko pirmo atidarymo
tinkamumo laikas 28 d.

Serija
Tinka iki

Ambrotusin

3 mg / ml sirupas

1 ml sirupo yra 3 mg ambroksolio hidrochlorido. Sudėtyje yra sorbitolio (E420).

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Nereceptinis vaistas.



LT11/153703/003

Ambrotusin

3 mg / ml sirupas

Ambroksolio
hidrochloridas

Atsikosėjimą
skatinantis
vaistas



Sirupas | 100 ml

Ambrotusin

3 mg / ml sirupas

Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Pakuotėje yra matavimo šaukštas.

Dozavimas

- ▶ Suaugusieji ir vyresni negu 12 metų pacientai: gerti 3 kartus per parą po 10 ml sirupo.
- ▶ Vaikams – priklausomai nuo amžiaus (žr. pakuotės lapelyje).

UAB „CeMex Farma“
Sukilėlių pr. 61-2, LT-49333, Kaunas, Lietuva

Ambrotusin

3 mg / ml sirupas

Ambroksolio
hidrochloridas

Atsikosėjimą
skatinantis
vaistas



Sirupas | 100 ml

Ambrotusin

3 mg / ml sirupas

Braille:

Ambrotusin
3 mg/ml

