



ZV089E9V

Ferrum Lek 10 mg/ml

sirupas / sirups / siirup

ferrum (III)

100 ml

sirupa
sirupa
siirupit

SANDOZ

LT Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

1 ml sirupo yra 10 mg geležies, geležies (III) hidroksido polimaltozės kompleksu pavidalu. 5 ml sirupo (1 matavimo šaukštelis) yra 50 mg geležies, geležies (III) hidroksido polimaltozės kompleksu pavidalu. Dėžutėje yra 5 ml matavimo šaukštas. Sudėtyje yra sacharozės, sorbitolio (E420), metilo parahidroksibenzoato (E218), propilo parahidroksibenzoato (E216), etanolio 96 % ir propilenglikolio (E1520). Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Vartoti per burną. Receptinis vaistas. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. LT/1/2000/1086/002

LV Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

1 ml sirupa satur 10 mg dzelzs (III) hidroksīda (III) hidroksīda polimaltozes kompleksa veidā). 5 ml (1 mērkarote) sirupa satur 50 mg dzelzs (III) (dzelzs (III) hidroksīda polimaltozes kompleksa veidā). Iepakojumam pievienota karote (5 ml). Satur sacharozī, sorbita šķīdumu (E 420), metilparahidroksibenzoātu (E 218), propilparahidroksibenzoātu (E 216), etilspirtu un propilēnglikolu (E 1520). Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C. Iekšējai lietošanai. Receptu zāles. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Reģ. nr: 00-0561

Ferrum Lek 10 mg/ml

sirupas / sirups / siirup

ferrum (III)

100 ml

sirupa
sirupa
siirupit

SANDOZ

EE Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

1 ml siirupit sisaldab 10 mg rauða [raud (III)hüdroksiid-põlmaltoos-kompleksina]. Üks mõõtelusikatäis (5 ml) siirupit sisaldab 50 mg rauða [raud(III)hüdroksiid-põlmaltooskompleksina]. Pakend sisaldab mõõtelusikat (5 ml). Sisaldab sahharoosi, sorbitooli lahust (E420), metüülparahüdroksübensoaati (E218), propüülparahüdroksübensoaati (E216), etüülalkoholi ja propüleenglikooli (E1520). Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Suukaudne. Retseptiravim. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Müügiloa nr. 356301

Sandoz d. d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Slovēnija/Slovēnija/Slovenia



Ferrum Lek 10 mg/ml

sirupas/sirups/siirup

ferrum (III)

LT Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Vartoti per burną./**LV** Pirms lietošanas izlasiet
lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai./
EE Enne ravimi kasutamist lugege pakendi
infolehte. Suukaudne.

100 ml sirupo/sirupa/siirupit

SANDOZ



46368043

Lot

EXP

