

A place for applying information by the printer during coding, in the packaging process. The font and size of text and codes may vary depending on the equipment used in production.



Nereceptinis vaistas. Vartoti ant odos. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Lokalus sąnarių ir minkštųjų audinių skausmo ir uždegimo simptomų mažinimas:
 - sausgyslių, raiščių, raumenų ir sąnarių traumos, pvz. patempimo, išnirimo ar sumušimo atveju;
 - lokalaus minkštųjų audinių uždegimo atveju.
 Vartojant gelio pagal šias indikacijas, gydymą rekomenduojama peržiūrėti po 14 dienų.

Paviršinių sąnarių, pavyzdžiui kelio, osteoartrito gydymas.

Suaugusieji ir vyresni kaip 14 metų paaugliai:
 geliu reikia tepti skaudamą vietą 3-4 kartus per dieną, atidžiai įtrinant kol įsigers į odą.


1 g gelio yra 10 mg diklofenako natrio druskos.

Sudėtyje taip pat yra karbomero, makrogolio 400, propilenglikolio (E1520), dietanolamino, izopropilo alkoholio, natrio benzoato (E211), išgryninto vandens.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.
 Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
 Tinkamumo laikas po tūbelės pirmojo atidarymo: 6 mėnesiai.

Lokalus sąnarių ir minkštųjų audinių skausmo ir uždegimo simptomų mažinimas

Diclofenac Siromed
10 mg/g gelis
 diklofenako natrio druska
40 g



Serija
Tinka iki

SOPHARMA AD, 16 Iliensko Shosse Str., Sofia 1220, Bulgarija.

LT/1/14/3636/001



diclofenac siromed
10 mg/g




Информационен панел	КУТИЯ
Продукт	Диклофенак Сиромед
Лекарствена форма	гел
Дозова единица	10 mg/g
Количество в 1 опаковка	1 туба / 40 g
Пазар	Литва
Версия номер	1.0/05.03.2024
Шрифт	Compton
Размер на шрифта	21, 16, 11, 9, 7 p
Брой цветовете	4
Цвят	PANTONE 136, PANTONE 1645, PANTONE 288, Black
Размери на кутията	150/37/28 mm
Използван материал	картон с едностранно пигментно покритие

* In the real printed mock ups, it is possible to apply additional codes (pharma codes, production codes and other) that are not been visualized in current layout.

Diclofenac Siromed 10 mg/g gelis

diklofenako natrio druska
40 g



1 g gelio yra 10 mg diklofenako natrio druskos.

Sudėtyje taip pat yra karbomero, makrogolio 400, propilenglikolio (E1520), dietanolamino, izopropilo alkoholio, natrio benzoato (E211), išgryninto vandens.

Vartoti ant odos.

Diclofenac Siromed vartojamas lokalaus sąnarių ir minkštųjų audinių skausmo ir uždegimo simptomų mažinimui. Plačiau apie simptomus ir vartojimo būdą būtina perskaityti pakuotės lapelyje.

Tinkamumo laikas po tūbelės pirmojo atidarymo: 6 mėnesiai.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

LT/1/14/3636/001



Lot (EXP)



EXP (Lot)

Информационен панел	ТУБА
Продукт	Диклофенак Сиромед
Лекарствена форма	гел
Дозова единица	10 mg/g
Количество в 1 туба	40 g
Пазар	Литва
Версия номер	1.0/07.03.2024
Шрифт	Campton
Размер на шрифта	16, 12, 9, 7 p
Брой цветовете	2
Цвят	PANTONE 1645, PANTONE 288
Размери на тубата	L 140, Ø 25 mm
Използван материал	алуминий с вътрешно лаково покритие

* In the real printed mock ups, it is possible to apply additional codes (pharma codes, production codes and other) that are not been visualized in current layout.