



Ultravist®

769 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas
769 mg/ml šķīdums injekcijām un infūzijām
769 mg/ml sūste- vōi infusiooñilahus
iopromidum

- 370 mg I/ml
- 10 x 200 ml
- leisti j
vena/
arterijā
intra-
venozai/
intra-
arteriālai
lietošanai
intra-
venoosne/
intra-
arteriaalne

Calcii dinatrii edetas, trometamolom,
acidum hydrochloridum, aqua ad inieciabile.
1 ml tirpalo yra 769 mg jopromido,
atitinkančio 370 mg jodo. Prieš vartojimą
perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti
vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje
vietoje. Pirmą kartą pradūrus
buteliuką, tirpalą suvartoti per 10 val. Laikyti
ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje,
kad preparatas būtų apsaugotas nuo
šviesos. Saugoti nuo jonizuojančios
spinduliuotės. Receptinis vaistas.

1 ml šķīduma satur 769 mg jopromīda,
kas atbilst 370 mg joda. Pirms lietošanas
izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt
bērniem neredzamā un nepieejamā



vietā. Pēc tiešā iepakojuma pirmās
atvēršanas šķīdums jāizlieto
10 stundu laikā. Uzglabāt temperatūrā
līdz 30°C. Sargāt no gaismas un
jonizējošā starojuma. Receptšu zāles.

Ūks ml lahust sisaldab
769 mg jopromiidi,
mis vastab 370 mg joodile.
Enne ravimi kasutamist lugege
pakendi infolehte. Hoida laste
eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Pärast sisepakendi esmast avamist
tuleb lahus ära kasutada 10 tunni
jooksul. Hoida temperatuuril kuni
30°C. Hoida valguse ja ioniseeriva
kiirguse eest kaitstult. Retseptiravim.

LT/1/95/2582/009 - LV 96-0120
EE 070094

Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1,
51373 Leverkusen
Vokietija/Vācija/Saksamaa

88396286

LOT

EXP

Bayer



Ultravist®

769 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas
769 mg/ml šķīdums injekcijām un infūzijām
769 mg/ml sūste- või infusioonilahus
iopromidum

1 ml tirpalo yra 769 mg jopromido,
atitinkančio 370 mg jodo.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Pirmą kartą pradūrus buteliuką, tirpalą suvartoti per 10 val.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas
būtų apsaugotas nuo šviesos. Saugoti nuo jonizuojančios
spinduliuotės. Receptinis vaistas.

1 ml šķīduma satur 769 mg jopromīda,
kas atbilst 370 mg joda.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Pēc tiešā iepakojuma pirmās atvēršanas šķīdums
jāizlieto 10 stundu laikā. Uzglabāt temperatūrā
līdz 30°C.

Sargāt no gaismas un jonizējošā starojuma.
Recepšu zāles.

Üks ml lahust sisaldab 769 mg jopromiidi,
mis vastab 370 mg joodile.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Pärast sisepakendi esmast avamist tuleb lahus
ära kasutada 10 tunni jooksul.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida valguse ja ioniseeriva kiirguse eest kaitstult.
Retseptiravim.

LT/1/95/2582/009 - LV 96-0120 - EE 070094

370 mg I/ml

- 74 g I
- 200 ml
- leisti i
vena/
arterijā
intra-
venozaī/
intra-
arteriālai
lietošanai/
intra-
venoosne/
intra-
arteriaalne

LOT

EXP

Ultravist®

LOT

Ultravist®

LOT

100

50

0

88396278

