



RÉSERVE DE VERNIS



The hatched area represents an unvarnished part of the packaging where the batch number, expiry and/or manufacturing date and any other human readable data (e.g. product code, serial number, national number ...) is printed during the final packaging stage of the manufacturing process, together or not with the datamatrix, as and when applicable in accordance with national/regional regulations.

septodont

Septanest Forte

40 mg/ml + 10 mikrogrammi/ml
 Süstelahus
 artikaiinvesinikkloriid/adrenaliin
 Infiltratsioon ja perineuraalne
 Dentaalne
 Retseptiravim

50 x 1,7 ml kolbampulli

SEPTODONT
 58, rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
 Prantsusmaa / Francija / Francúzija

Müügiloa nr: 347301

septodont

Septanest Forte

40 mg/ml + 10 mikrogramų/ml
 Injekcinis tirpalas
 artikaino hidrochloridas/adrenalinas
 Infiltracijai ir leisti aplink nervus
 Vartoti ant dantų arba į juos
 Receptinis vaistas
 50 x 1,7 ml užtaisų

SEPTODONT
 58, rue du Pont de Créteil
 94100 Saint-Maur-des-Fossés - Prancūzija

LT/1/01/3248/001

septodont

Septanest Forte

40 mg/ml + 10 mikrogrami/ml
 Šķīdums injekcijām
 artīcaini hidrochlorīdum/epinephrinum
 Infiltrācijai un perineirālai lietošanai
 Lietošanai zobārstniecībā
 Receptu zāles
 50 x 1,7 ml kārtidži

SEPTODONT
 58, rue du Pont de Créteil
 94100 Saint-Maur-des-Fossés
 Francija

Reg. Nr.: 02-0231

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. 1 ml süstelahust sisaldab 40 mg artikaiinvesinikkloriidi ja 10 mikrogrammi adrenaliini (adrenaliintartraadina). Ühes kolbampullis on 1,7 ml süstelahust, mis sisaldab 68 mg artikaiinvesinikkloriidi ja 17 mikrogrammi adrenaliini (adrenaliintartraadina). Abiained: Naatriumkloriid, naatriummetabisulfit (E223), naatriumhüdroksiid, süstevesi. Sisaldab naatriumit ja metabisulfiiti. Lisateavet vt pakendi infolehest. Ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata ravimpreparaat hävitada. Kasutada kohe pärast kolbampulli avamist. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 30°C. Mitte lasta külmuda. Hoida kolbampullid välispakendis, valguse eest kaitsitud.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 1 ml injekcinio tirpalo yra 40 mg artikaino hidrochlorido ir 10 mikrogramų adrenalino (adrenalinio tartrato pavidalu). Kiekviename 1,7 ml užtaise yra 68 mg artikaino hidrochlorido ir 17 mikrogramų adrenalino (adrenalinio tartrato pavidalu). Pagalbinių medžiagų sąrašas: natrio chloridas, natrio metabisulfitas (E223), natrio hidroksidas ir injekcinis vanduo. Sudėtyje yra natrio ir metabisulfito, papildoma informacija pateikiama pakuotės lapelyje. Skirta vartoti tik vieną kartą. Nesuvargotą tirpalą išmesti. Atidarius užtaisą, vartoti nedelsiant. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti žemesnėje kaip 30°C temperatūroje. Negalima užšaldyti. Užtaisus laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 1 ml šķīduma injekcijām satur 40 mg artīcaina hidrochlorīda un 10 mikrogramus adrenalīna (adrenālīna tartrāta veidā). Katrs 1,7 ml kārtidžs satur 68 mg artīcaina hidrochlorīda un 17 mikrogramus adrenalīna (adrenālīna tartrāta veidā). Palīgvielas: nātrija hlorīds, nātrija metabisulfiits (E223), nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām. Satur nātriju un metabisulfitu, papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā. Tikai vienreizējai lietošanai. Izmet neizlietoto šķīdumu. Izlietot uzreiz pēc kārtidža atvēršanas. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Nesasaldēt. Uzglabāt kārtidžus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.