



SANDOZ

piperacillinum/tazobactamum

infuzioonilahuse pulber / pulveris infuzijii bijiduma pagatavotanaal /

Piperacillin/Tazobactam Sandoz® 4000 mg/500 mg

LI Pried vartojimo paraskaitykite pakuotės lapelį. Šis vaistas yra piperacilino ir tazobactamo derinys. Tazobactamo natrio pavidalas. Sudėtyje yra natrio ir penicilino. Daugiau informacijos pateikiama pakuotės lapelyje. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamose vietose. Šis vaistas negalima maišyti su vartoti kartu su bet koku aminoglikozidu ir negalima skirta Ringero kalcio (Hartmann) tirpalui. Pried vartojimo paraskaitykite pakuotės lapelį dėl visos sudėtinųjų medžiagų sąrašo. Vietkariškos vartojimo. Sausytkite pakuotės lapelį dėl paruošimo vaisto laikymo sąlygų. Bet koki nesuvartojęs šio vaisto likučius reikia išmesti. Receptinis vaistas. LI/1/08/1321/003

IV Pirmą kartą vartojant būtina išnagrinėti instrukcijas. Remiamasis vaistas piperacilino ir tazobactamo derinys. Tazobactamo natrio pavidalas. Sudėtyje yra natrio ir penicilino. Daugiau informacijos pateikiama pakuotės lapelyje. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamose vietose. Šis vaistas negalima maišyti su vartoti kartu su bet koku aminoglikozidu ir negalima skirta Ringero kalcio (Hartmann) tirpalui. Pried vartojimo paraskaitykite pakuotės lapelį dėl visos sudėtinųjų medžiagų sąrašo. Vietkariškos vartojimo. Sausytkite pakuotės lapelį dėl paruošimo vaisto laikymo sąlygų. Bet koki nesuvartojęs šio vaisto likučius reikia išmesti. Receptinis vaistas. LI/1/08/1321/003

III Esme vartojimo instrukcija pateikiama pakuotės lapelyje. Remiamasis vaistas piperacilino ir tazobactamo derinys. Tazobactamo natrio pavidalas. Sudėtyje yra natrio ir penicilino. Daugiau informacijos pateikiama pakuotės lapelyje. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamose vietose. Šis vaistas negalima maišyti su vartoti kartu su bet koku aminoglikozidu ir negalima skirta Ringero kalcio (Hartmann) tirpalui. Pried vartojimo paraskaitykite pakuotės lapelį dėl visos sudėtinųjų medžiagų sąrašo. Vietkariškos vartojimo. Sausytkite pakuotės lapelį dėl paruošimo vaisto laikymo sąlygų. Bet koki nesuvartojęs šio vaisto likučius reikia išmesti. Receptinis vaistas. LI/1/08/1321/003

4000 mg

Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Slovėnija/Slovenija/Slovenien

Sudėtyje yra penicilino.
Satur penicilinu.
Sudėtyje penicilinu.



Piperacillin/Tazobactam Sandoz® 4000 mg/500 mg

infuzijai infuzijam tirpalui / pulveris infuzijii bijiduma pagatavotanaal / infuzioonilahuse pulber

piperacillinum/tazobactamum

10 būklėje infuzijai infuzijam tirpalui / pulveris infuzijii bijiduma pagatavotanaal / pulberis infuzijii bijiduma pagatavotanaal

SANDOZ

Piperacillin/Tazobactam Sandoz® 4000 mg/500 mg

infuzijai infuzijam tirpalui / pulveris infuzijii bijiduma pagatavotanaal / infuzioonilahuse pulber

piperacillinum/tazobactamum

10 būklėje infuzijai infuzijam tirpalui / pulveris infuzijii bijiduma pagatavotanaal / pulberis infuzijii bijiduma pagatavotanaal

SANDOZ

Piperacillin/Tazobactam Sandoz® 4000 mg/500 mg

miltelīai infūzijām / pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai /
infusioonilahuse pulber

piperacillinum/tazobactamum

LT Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Leisti į vengti ištirpinimo ir praskiedimo.

LV Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravenozai lietošanai pēc izšķīdināšanas un atšķaidīšanas.

EE Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenosseks kasutamiseks pärast valmistamist ja lahendamist.

SANDOZ

46374528

EXP

Lot

