

920435-HU

Sanofi Winthrop Industrie

82 avenue Raspail
94250 Gentilly
Prancūzija / Francija / Prantsusmaa

LT/1/10/1882/006

16-0098

Müügi loa nr: 912316

PC

Lot

EXP

SN

Vienoje (0,5 ml) vakcinos dozēje yra:

ne mažiau kaip 2 TV (2 Lf) difterijas anatoksinu, ne mažiau kaip 20 TV (5 Lf) stabilīgās anatoksinu, 2,5 mikrogramu kokliušo anatoksinu, 5 mikrogramai filamentinio hemaglutinino, 3 mikrogramai pertaktino, 5 mikrogramai 2-ojo ir 3-iojo tipo fimbriju. Adsorbuota 1,5 mg aliuminio fosfatu (0,33 mg Al^{3+}).

1 deva (0,5 ml) satur:

≥ 2 SV (2 Lf) difterijas toksoida, ≥ 20 SV (5 Lf) stingumkrampju toksoida, 2,5 μg garā klepus toksoida, 5 μg bārktiņu hemaglutinīna, 3 μg pertaktīna, 5 μg 2.un 3. tipa fimbrijas; adsorbēts uz 1,5 mg aluminija fosfāta (0,33 mg Al^{3+}).

1 annus (0,5 ml) sisaldab:

≥ 2 RÜ (2 Lf) difteeria toksoidi, ≥ 20 RÜ (5 Lf) teetanuse toksoidi, 2,5 mikrogrammi lākakõha toksoidi, 5 mikrogrammi filamentooset hemaglutiniini, 3 mikrogrammi pertaktiini, 5 mikrogrammi fimbria tüüpe 2 ja 3; adsorbeeritud 1,5 mg alumiiniumfosfaadile (0,33 mg Al^{3+}).

ADACEL

injekcinē suspensija uzpildytame švirkšte
suspensija injekcijām pilnšļircē
süstesuspensioon süstlis

Tdap

**Vakcina nuo difterijos, stabilgės ir kokliušo (neląstelinė, komponentinė)
(adsorbuota, su mažesniu antigeno (-ų) kiekiu)**

**Adsorbēta difterijas, stingumkrampju un garā klepus (acelulārs komponents)
vakcina ar samazinātu antigēnu saturu.**

Diphtheria, Tetanus, Pertussis (acellular component) Vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)

**Difteeria, teetanuse, lākakõha (atsellulaarne komponent) vaktsiin
(adsorbeeritud, vähendatud antigeeni(de) sisaldus)**



Injekcinē suspensija uzpildytame švirkšte / Suspensija injekcijām pilnšļircē / Süstesuspensioon süstlis

1 uzpildytas švirkštas (0,5 ml) su 1 adata / 1 pilnšļirce (0,5 ml) ar 1 adatu /

1 süstel (0,5 ml) koos 1 nõelaga

sanofi

Pagalbinės medžiagos: fenoksietanolis, injekcinis vanduo.
Prieš vartojimą sukratykite.

Leisti į raumenis.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamose vietose.

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Negalima užšaldyti.

Švirkstą laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Receptinis vaistas.

Paligvielas: fenoksietanols, ūdens injekcijām

Pirms lietošanas sakratīt. Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C). Nesasaldēt.

Šļirci uzglabāt ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

Neizlietotās zāles vai citi izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Receptu zāles.

Abiained: fenoksüetanol, süstevesi.

Enne kasutamist loksutada.

Intramuskulaarne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda. Hoida süstel välispakendis, valguise eest kaitstult. Retseptiravim.