

Lot
EXP

Vidinio ir išorinio hemorojaus sukeltiems simptomams malšinti.

Procto-Glyvenol®

400 mg/40 mg žvakutės tribenosidum, lidocainum
10 žvakučių**Procto-Glyvenol®**
400 mg/40 mg žvakutės/supozitoriji
tribenosidum, lidocainum

Pharma code 12

118 x 28 x 63

1 žvakutėje yra 400 mg tribenosido ir 40 mg lidokaino.
Pagalbinės medžiagos: kietieji riebalai.
Nereceptinis vaistas
Katrų supozitorijų satur 400 mg tribenosida un 40 mg lidokaina.
Paigivielas: cietie tauki.
Bezrecepšu zāles.
Recordati Ireland Ltd Raheens East, Ringaskiddy, Co. Cork, Airija/Īrija LT/1/95/0944/001 98-0566



Iekšējo un ārējo hemoroīdu izraisītu simptomu ārstēšanai.

Procto-Glyvenol®

400 mg/40 mg supozitoriji *tribenosidum/lidocainum*
10 supozitoriji5292
B
A500081/2

Vartoti j tiesiajā žarnā.
Pirms vartojimā perskaitykite pakuotēs lapelī.
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje.
Vartoti po 1 žvakutę ryte ir vakare.
Vaisto negerti.

Rektālai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lietot pa 1 supozitorijam divas reizes dienā, no rīta un vakarā. Kad simptomi mazinājušies, lietot vienu reizi dienā. Nelietojiet iekšējīgi. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 30° C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.