pharma code

Po buteliuko pirmojo atidarymo vaisto tinkamumo laikas 28 d.

Serija

Tinka iki

Ambrotusin

3 mg / ml sirupas

ambroksolio hidrochloridas

Atsikosėjimą skatinantis vaistas

Sirupas | 100 ml

Ambrotusin

3 mg / ml sirupas

Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Pakuotėje yra matavimo šaukštas.

Dozavimas

- Suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų paaugliams reikia gerti 3 kartus per parą po 10 ml sirupo.
- Vaikams – priklausomai nuo amžiaus (žr. pakuotės lapelyje).

UAB Eletis Pharma
Sukilėlių pr. 61-2, LT-49333, Kaunas, Lietuva

Ambrotusin

3 mg / ml sirupas

ambroksolio hidrochloridas

Atsikosėjimą skatinantis vaistas

Sirupas | 100 ml

Ambrotusin

3 mg / ml sirupas

1 ml sirupo yra 3 mg ambroksolio hidrochlorido. Sudėtyje yra sorbitolio (E420).

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Nereceptinis vaistas.

4 779039 100512

LT/1/15/3703/003

Ambrotusin

3 mg / ml sirupas

pharma code

Braille:

Ambrotusin
3 mg/ml