

46 x 21 x 97

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Vienoje tabletėje yra 10 mg cetirizino dihidrochlorido.

Sudėtyje yra laktozės monohidrato.

Dozavimas Vaikams nuo 6 iki 12 metų:

po pusę tabletės du kartus per parą.

Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams:

po 1 tabletę vieną kartą per parą.

• Nereceptinis vaistas.

LT/1/03/1985/001



Lot
EXP

46 x 21 x 97
Code
46362977
3745



7 613421 143817

Sandoz d.d.
Verovškova 57
1000 Ljubljana
Slovėnija

Aceterin express 10 mg
plėvele dengtos tabletės
cetirizino dihidrochloridas
SANDOZ

Aceterin express 10 mg

plėvele dengtos tabletės

cetirizino dihidrochloridas

Indikacijos Suaugusiems žmonėms ir 6 metų
bei vyresniems vaikams:

- sezoninio ir nuolatinio alerginio rinito simptomams
(nosies ir akių) palengvinti;
- lėtinės idiopatinės dilgėlinės simptomams palengvinti.

SANDOZ

10 tablečių

Aceterin express 10 mg

plėvele dengtos tabletės

SANDOZ

print width 80 mm

Aceterin express 10 mg tabletès cetirizino dihidrochloridas SANDOZ	Aceterin express 10 mg tabletès cetirizino dihidrochloridas SANDOZ
ress 10 mg ridas	Aceterin express 10 mg tabletès cetirizino dihidrochloridas SANDOZ
Aceterin express 10 mg tabletès cetirizino dihidrochloridas SANDOZ	Aceterin express 10 mg tabletès cetirizino dihidrochloridas SANDOZ
ress 10 mg ridas	Aceterin express 10 mg tabletès cetirizino dihidrochloridas SANDOZ

60 mm