

Leserichtung
reading direction



ACC[®] 100 mg
acetylcysteinum
miltelai geriamajam tirpalui/
pulveris iekšīgi lietojami šķiduma pagatavošanai /
suukaudse lahuse pulver

50110392
40131898
108x42x85 mm
Code 2505

LT Vaistas, skystinantis kvėpavimo takų gleives.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną.
Kiekviename paketylyje (3 g) miltelių yra 100 mg acetilsisteino.
Sudėtyje yra sacharozės, gliukozės ir laktozės.
Laikyti vaikams nepasiekiamose ir nepasiekiamose vietose.
Dozavimas. Suaugusiems 4-6 paketyliai per parą,
vaikams - priklausomai nuo amžiaus. Žr. pakuotės lapelį.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Nereceptinis vaistas. LT/1/07/0593/005

LV Mukolītisks Bāzeklis.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšīgi lietotānai.
Katrs paciņš (3 g) pulvera satur 100 mg acetilsisteīna.
Satur sacharozī, glikozī un laktozī. Sīkākā informācijā skatīt lietošanas instrukciju.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Devot. Pieaugušajiem 2 paciņus 2-3 reizes dienā, bērniem - atkarībā no vecuma.
Skatīt lietošanas instrukciju. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.
Bezreceptu zāles. Reģ.nr.: 00-0284

EE Rõõga lahustamine.

Enne ravimi kasutamist lugeda pakendi infolõhet. Suukaudne.
Üks kott (3 g) pulbrit sisaldab 100 mg atseültsisteini.
Sisaldab sahharoosi, glükoozi ja laktoosi.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Annustamine. Täiskasvanud 2-3 kotti 2-3 korda päevas.
Lapsed vastavalt vanusele - lugeda pakendi infolõhet.
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Käsimüügitravim. Müügilõõa nr: 298800



Sandoz d.d.
Varovikova 57
S41000 Ljubljana
Slovenija/Slovenija/Slovenia

ACC[®] 100 mg

miltelai geriamajam tirpalui/
pulveris iekšīgi lietojama šķiduma pagatavošanai /
suukaudse lahuse pulver

acetylcysteinum



SANDOZ

ACC[®] 100 mg

miltelai geriamajam tirpalui/
pulveris iekšīgi lietojama
šķiduma pagatavošanai /
suukaudse lahuse pulver

acetylcysteinum

SANDOZ

Lot
EXP



Leserichtung
reading direction

