







Only Braille text, will not be printed



Lot

EXP



Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Sausi milteliai: Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Paruošta suspensija: Laikyti šaldytuve (2 °C-8 °C).
Negalima užšaldyti.
Suvartoti per 7 paras.

Augmentin

200 mg/28,5 mg/5 ml
milteliai geriamajai suspensijai
amoksicilinas/klavulano rūgštis



Sudėtyje yra aspartamo (E 951),
benzilo alkoholio
ir maltodekstrino (gliukozės).
Sudėtyje yra penicilino.

Milteliai 70 ml
geriamosios suspensijos

**200 mg/
28,5 mg/
5 ml**

Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Prieš vartojimą gerai supurtykite. Prieš vartojimą ištirpinti vandenyje. Kiekviename pagal nurodymus paruoštos geriamosios suspensijos mililitre yra amoksicilino trihidrato kiekis, kuris atitinka 40 mg amoksicilino, ir kalio klavulanato kiekis, kuris atitinka 5,7 mg klavulano rūgšties.
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
LT/1/98/3992/001
62000000088365



