

Base label

xxxxxx-xx / xxxxxxxxxxx-xx-xx

xxxxxx-xx / xxxxxxxxxxx-xx-xx

Metadon
DAK
1 mg/ml

geriamasis tirpalas
Metadono hidrochloridas
1000 ml
Taurelė

12-LT



1 ml geriamojo tirpalo yra 1 mg metadono hidrochlorido. Sudėtyje yra sacharozės, propilo parahidroksibenzoato (E216), metilo parahidroksibenzoato (E218), etanolio (96 %).
Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Vartoti per burną.
Receptinis vaistas
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Registruotojas:
Orifarm Healthcare A/S
Odense, Danija/Danmark
LT/x/xx/xxxx/xxx

PC:
SN:
Lot
EXP


7 10 383 19 11 643 6

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Metadon DAK 1 mg/ml geriamasis tirpalas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. • Netiesiogiai šio lapelio, nes vėl gali greitai jį perskaityti. • Jeigu kitių dozuojamų kraujum, kreipėtes į gydytoją arba vaistininką. • Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitoms žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali būti pavojingas (net tiems, kurių ligos simptomai yra labai panašūs Jūsų). • Jeigu pasireikė šalutiniai poveikiai (net jeigu jų šiuo lapelyje nenurodyta), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrį. Apie ką rašoma šiame lapelyje? 1. Kas yra Metadon DAK ir kam jis vartojamas	2. Kas širdies ir priešvartojant Metadon DAK 3. Kaip vartoti Metadon DAK 4. Galima šalutinis poveikis 5. Kaip laikyti Metadon DAK 6. Pakuotės turinys ir kita informacija 1. Kas yra Metadon DAK ir kam jis vartojamas Metadonas yra stiprus analgetikas (skausmą malšinantis vaistas), veikiantis panašiai kaip morfinas, vartojamas skausmui malšinti. Metadon DAK vartojamas: - stipriam skausmui malšinti; - priklausomybi nuo opioidų gydyti. 2. Kas žinojimas prieš vartojant Metadon DAK vartoti negalima: - jeigu yra alergija veikliajam medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriaus); - jei yra ūminis kepenų nepakilimas, ūminis priepuolis, sunkus bronchitas (plaučių ligos) arba sunki plaučių embolizacija.	- jeigu gretotės monoaminoksidazė (MAO) inhibitoriais arba nuo jų vartojimo nutraukimo nepraėjus 14 dienų. Išėjimai ir atsargumo priemonės Pastebėkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Metadon DAK. 1. Kas yra Metadon DAK ir kam jis vartojamas Metadonas yra stiprus analgetikas (skausmą malšinantis vaistas), veikiantis panašiai kaip morfinas, vartojamas skausmui malšinti. Metadon DAK vartojamas: - stipriam skausmui malšinti; - priklausomybi nuo opioidų gydyti.	- jeigu vartojate ar nemėn vartojote kitų vaistų arba dėl to neturite kiti, apie tai pasakykite gydytoju arba vaistininkui. Pastebėkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Metadon DAK, paaiškinti bet kurio iš toliau paminėtų simptomų: - alpavimas, nuovargis, apsvaigę praradimas, pykinimas, vėmimas ar sumaišyti kraujagyslės. Tai gali būti pavojinga, kad antiritalai gamina per mažai hormono kortizolio, todėl gali prireikti pakeičiantis gydymo hormonais. - ilgalaikis vartojimas gali kelti sumažėjusį lytinį hormonų kiekį ir padidėjusį hormono prolaktino kiekį, bei padidėję toksiški simptomai, kaip sumažėjusi lytinis potraukis, impotencija ir mėsūtiščių reiškiniai (jamenorėja, kreipėtes į gydytoją). Sportininkams Dopingo testo metu šis vaistas randamas šlapime ir dozuoti teigiamą rezultatą, galimo disqualifikacija.	Šis vaistas gali sukelti priklausomybę ir pripratimą (toliau pažym pavelsia). Svarbi reikiama dozėmis dozuoti, gydymą Metadon DAK būna nutraukti palaipsniui (žr. 3 skyriaus poskytį) „Nustojus vartoti Metadon DAK“. Kiti vaistai ir Metadon DAK Jeigu vartojate ar nemėn vartojote kitų vaistų arba dėl to neturite kiti, apie tai pasakykite gydytoju arba vaistininkui. Alkoholis, opioidiniai vaistai, raminamieji vaistai, tokie kaip benzodiazepinai ir supe vaistai, vitole opoideiniai analgetikai ir trankikliai antidepresantai (prieš paskyrimą su tikslumu gydyti) gali stiprėti kartu vartojamos metadono medžiagos ir apskritimi kepsmimo (kepsmąjį slopinant) poveikį, padidėja komos rizika, ir tai gali kelti pavojingą gyvybę. Todėl šiuo vaistu kartu vartoti galima tik tada, kada nepamiršoma laikytis kitų gydymo nurodymų. Tačiau jei kitų gydytojas paskiria metadono kartu su raminamaisiais vaistais,	vaisto doze ir gydymo trukme yra ribojamas. Prieš pradėdami laisvą gydytoją apie visus raminamuosius vaistus, kuriuos vartojate, ir gretos vaistus (jei gydytojo rekomendavusius vaisto dozes. Toliau nurodymais informuoti: šio ir apsaugos ar gimines apie aukščiau aprašytus simptomus, susisiekiu su savo gydytoju. Metadon DAK 1 mg/ml geriamosio tirpalo negalima vartoti kartu su monoaminoksidazės (MAO) inhibitoriais ir 14 parų po jų vartojimo nutraukimo, nei gali pakenkti centrinės nervų sistemos slopinimui ar kvėpimui. Vaistai nuo traukulų, kai kurie vaistai nuo virusinės infekcijos, penicilino vaistai, antiretrovirusiniai vaistai, vartojami esant ŽIV infekcijai, ir šlapimo rūgšties vaistai (jamenorėja) slopina metadono poveikį. Kai kurie vaistai kraujotakoms gydyti	(jei... klopidogrelis, prasugrelis, tikagregoras) gali sukelti vėliau ar silpniau, nei Jūs vartojate kartu su opiumu. Kai kurie vaistai nuo depresijos, antipsichotikai, vaistai nuo gripelio ir ŽIV ligos bei cimetidinas (jo mūšimas skrandžio sulčių rūgštingumą) stiprina metadono poveikį bei didina perdozavimo riziką. Kartu su metadonu vartojant širdies dalyb vėlesnį vaistų, gali padidėti šalutinio poveikio širdies rizika. Jeigu kartu su metadonu vartojama serotonino reabsorbcijos inhibitorių (vaistai depresijai gydyti), padidėja žvargimo būklės - serotonino sindromo išsivystymo rizika. Jei metadono vartojate kartu su antidepresantais (jei... citalopramu, diazepamu, metilpropam, fluoksetinu, fluvelamynu, paroksetinu, setipramu, venlafaksinu, amitriptilinu, Nortriptam, imipraminu, nortriptilinu, bialutinu poveikio rizika padidėja. Jei patariate bet	kuri iš šių simptomų, nedelsiant paskirkimui kreiptis su gydytoju: - galvos svaigimas (jei... supūdimas, holuciacijos, komai); - greitas širdies plakimas, netabulis kraujagyslės, karščiavimas; - vėlavimas refleksai, sutrikusi koordinacija; - vėlavimas traukulių sutrikimų, simptomai Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant pigius be recepto, pasakykite gydytoju arba vaistininkui. Metadon DAK vartojimas su maistu, gerimais ir alkoholiu Kartu vartojimas maisto Metadon DAK poveikio jėkai nedaro. Alkoholis stiprina raminamąjį vaisto (raminamųjų) poveikį. Kitumas, įvedimo laikotarpis ir vartojimas Metadonas Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote,	kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Neturmo laukiantis vaisto vartoti galima tik tuo atveju, jeigu gydytojas nurodė, kad galima pradėti vartoti galimą žais. Žindymas Atsakyti žindymo laikotarpis vartoti Metadon DAK, gydytojas sprendžia individualiai. Jei vartodama metadono motinėse krūtimi ar planuojate maitinti krūtimi, pastebėkite su gydytoju, nes tai gali pakenkti Jūsų kūdikiui. Stebėkite, ar kūdikis nepasireiškia nemoty, padidėjusiu bei tokiu simptomu, kaip padidėjęs mieguistumas (sėdimo ne greitai). Parahidroklobenzotai gali sukelti alerginių reakcijų, kurios gali būti užduos. Jeigu vartojate kitų vaistų, įskaitant pigius be recepto, pasakykite gydytoju arba vaistininkui. Alkoholis stiprina raminamąjį vaisto (raminamųjų) poveikį. Metadonas sukelia vėjų įvairines funkcijas sutrikimus, pvz., erekcijos ir (ar) ejakuliacijos sutrikimus.	Vartojimas ir mechanizmas vartojimas Vartodami metadono, nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų, nes vaistas sukelia slopinamąjį poveikį. Metadon DAK sudėtyje yra sacharozės, metilto parahidroksibenzoato, propilo parahidroksibenzoato ir etanolo Išskiriamas tirpalas ml yra 34,5 mg sacharozės. Būna atžvelgti cukrinių diabetu sergantiesiems pacientams. Gali kelti darfmus. Jeigu gydytojas Jums yra skyp, kad netoleruotumėte kitų nors angliavandenių, kreipkitės į prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Parahidroklobenzotai gali sukelti alerginių reakcijų, kurios gali būti užduos. Toliau 90 ml esantis alkoholis kiekis atitinka 20 ml alaus ar 2 ml vyno. Alkoholis, esantis šio vaisto sudėtyje, gali daryti poveikį vaktum: ir suvėti mieguistumą bei egratso pokyčius. Alkoholis taip pat gali daryti poveikį kitių gydytojų vartojamų ir
---	--	--	---	--	---	---	--	---	---

Metadon DAK 1 mg/ml geriamasis tabletas Metadon hidrochloridas 100 mg/ml Taurale	dalyvaujė vertinimo vertinimo, abiejuose vaistuose yra tas pats veiklioji medžiaga, tačiau Metadon DAK geriamasis tabletas yra suapvalintas, o Metadon hidrochloridas yra pakeičioje sudėtyje, pakeičiantis Metadon DAK geriamasis tabletas. Metadon DAK geriamasis tabletas yra suapvalintas, o Metadon hidrochloridas yra pakeičioje sudėtyje, pakeičiantis Metadon DAK geriamasis tabletas. Metadon DAK geriamasis tabletas yra suapvalintas, o Metadon hidrochloridas yra pakeičioje sudėtyje, pakeičiantis Metadon DAK geriamasis tabletas.	Metadon DAK 1 mg/ml geriamasis tabletas yra suapvalintas, o Metadon hidrochloridas yra pakeičioje sudėtyje, pakeičiantis Metadon DAK geriamasis tabletas. Metadon DAK geriamasis tabletas yra suapvalintas, o Metadon hidrochloridas yra pakeičioje sudėtyje, pakeičiantis Metadon DAK geriamasis tabletas. Metadon DAK geriamasis tabletas yra suapvalintas, o Metadon hidrochloridas yra pakeičioje sudėtyje, pakeičiantis Metadon DAK geriamasis tabletas.	Metadon DAK 1 mg/ml geriamasis tabletas yra suapvalintas, o Metadon hidrochloridas yra pakeičioje sudėtyje, pakeičiantis Metadon DAK geriamasis tabletas. Metadon DAK geriamasis tabletas yra suapvalintas, o Metadon hidrochloridas yra pakeičioje sudėtyje, pakeičiantis Metadon DAK geriamasis tabletas. Metadon DAK geriamasis tabletas yra suapvalintas, o Metadon hidrochloridas yra pakeičioje sudėtyje, pakeičiantis Metadon DAK geriamasis tabletas.	Metadon DAK 1 mg/ml geriamasis tabletas yra suapvalintas, o Metadon hidrochloridas yra pakeičioje sudėtyje, pakeičiantis Metadon DAK geriamasis tabletas. Metadon DAK geriamasis tabletas yra suapvalintas, o Metadon hidrochloridas yra pakeičioje sudėtyje, pakeičiantis Metadon DAK geriamasis tabletas. Metadon DAK geriamasis tabletas yra suapvalintas, o Metadon hidrochloridas yra pakeičioje sudėtyje, pakeičiantis Metadon DAK geriamasis tabletas.
--	---	---	---	---

Braille (text)

Mathematical
Differential Equations

Total view (base label +insert)

xxxxxx-xx / xxxxxxxxxxx-xx-xx

Metadon
DAK
1 mg/ml

geriamasis tirpalas
Metadono hidrochloridas
1000 ml
Taurelė



12-LT



1 ml geriamojo tirpalo yra 1 mg metadono hidrochlorido. Sudėtyje yra sacharozės, propilo parahidroksibenzoato (E216), metilo parahidroksibenzoato (E218), etanolio (96 %).
Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Vartoti per burną.

Receptinis vaistas

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Registruotojas:
Orifarm Healthcare A/S
Odense, Danija/Danmark
LT/1/97/1625/001


7 038319 116436

PC:
SN:
Lot
EXP

