



GTIN:

Serija:

Serija:

Tinka iki:

Derigo data:

S.N.:

To be coded online along
with batch coding details

021C

340C

BLACK

Black
20%

IMI + Cila Rx 500mg 30 ml Injec.

Carton size - 50 x 40 x 87 mm

Market: LT/LV

RLL/PKGDEV - J10/09/09-V01,

J24/09/13-V02, J26/09/13-V03,

AK03/10/13-V04

SAP CODE: 5105293

PHARMA CODE: 105293

5105293

RANBAXY

Imipenem/Cilastatin
Ranbaxy 500 mg/500 mg
milteliai infuziniam tirpalui
pulveris infūzijų šķīduma pagatavošanai

Imipenemum/Cilastatinum

500mg/500mg

Milteliai infuziniam tirpalui
Pulveris infūzijų šķīduma pagatavošanai
1 g miltelių 30 ml buteliuke
1 g pulvera 30 ml flakonā1 buteliukas
1 flakonsLaikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje.
Paruoštą preparatą reikia vartoti nedelsiant.Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā.
Šis zāles jāievada uzreiz pēc izšķīdināšanas.Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir
nepastebimoje vietoje.
UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEJAMĀ UN
NEREDZAMĀ VIETĀ.Vartoti į veną.
Tikai intravenozai lietošanai.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

RANBAXY

Imipenem/Cilastatin
Ranbaxy 500 mg/500 mg
milteliai infuziniam tirpalui
pulveris infūzijų šķīduma pagatavošanai

Imipenemum/Cilastatinum

500mg/500mg

Milteliai infuziniam tirpalui
Pulveris infūzijų šķīduma pagatavošanai
1 g miltelių 30 ml buteliuke
1 g pulvera 30 ml flakonā1 buteliukas
1 flakonsPagalbinė medžiaga: buteliuke yra 20 mg
natrio-vadenilio karbonato.
Viens flakons satur arī 20 mg
nātrija hidroģēnkarbonāta.Vartoti į veną.
Tikai intravenozai lietošanai.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

RANBAXY

Imipenem/Cilastatin
Ranbaxy 500 mg/500 mg
milteliai infuziniam tirpalui
pulveris infūzijų šķīduma pagatavošanai

Imipenemum/Cilastatinum

500mg/500mg

Milteliai infuziniam tirpalui
Pulveris infūzijų šķīduma pagatavošanai
1 g miltelių 30 ml buteliuke
1 g pulvera 30 ml flakonā
1 buteliukas
1 flakons

RANBAXY

Imipenem/Cilastatin
Ranbaxy 500 mg/500 mg
milteliai infuziniam tirpalui
pulveris infūzijų šķīduma pagatavošanai

Imipenemum/Cilastatinum

500mg/500mg

Milteliai infuziniam tirpalui
Pulveris infūzijų šķīduma pagatavošanai
1 g miltelių 30 ml buteliuke
1 g pulvera 30 ml flakonā1 buteliukas
1 flakonsReceptinis vaistinis preparatas.
Recepšu zāles.LT/1/09/1742/004
Reg.Nr.: 09-0360

CODE No.: MP/DRUGS/28/15/83

Ranbaxy (UK) Ltd.
Building 4, Chiswick Park
566 Chiswick High Road
London, W4 5YE
Jungtinė Karalystė/ LielbritānijaViename buteliuke yra 530,1 mg imipenemo (atitinka 500 mg
bevandinio imipenemo) ir 530,7 mg cilastatino natrio druskos
(atitinka 500 mg cilastatino). Viename mililitre paruošto tirpalo yra
5 mg imipenemo ir 5 mg cilastatino.Viens flakons satur 530,1 mg imipenemo, kas atbilst 500 mg
beždens imipenemo, un 530,7 mg cilastatino nātrija sāls,
kas atbilst 500 mg cilastatīna. Pēc pagatavošanas šķīdums satur
5 mg/ml imipenēma un 5 mg/ml cilastatīna.Vienam buteliukam yra 37,5 mg natrio. Būtina atsižvelgti,
jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste.Viens šio žaliavinio flakons satur 37,5 mg natrio. Tas įeivėro pacientams,
kuri ievėro diėtu ar mazu vai kontroliėtu nātrija daudzumu.Preparatas skirtas vienkartiniam vartojimui.
Nesuvartotą preparatą reikia sunaikinti.
Tikai vienreizėjam lietošanai.
Neizlietotais sūturis jāiznīcina.Infūzija į veną.
Vartoti pagal gydytojo nurodymus.
Informacija apie atskiedimą yra pakuotės lapelyje.
Negalima tirpinti tirpikliuose, kurių sudėtyje yra laktato.
Negalima maišyti arba vartoti papildomai kartu su kitais antibiotikais.Intravenozai infūzijai.
Lietot atbilstoši ārstu norādījumiem.
Norādījumus par šķīdināšanu skatīt lietošanas instrukcijā.
Nešķīdināt laktātu saturošos šķīdumos.
Nelietot maistijām ar citām antibiotikām,
nepievienot citiem antibiotku šķīdumiem.Vartoti į veną.
Tikai intravenozai lietošanai.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Imipenem/Cilastatin
Ranbaxy 500 mg/500 mg

i.v.

100

133

100

Black
30%

J26/09/13-V03, AK03/10/13-V04

PHARMA CODE: 617