

Lot
EXP

Bedufora

100 µg/6 µg 

spūsnyje suslėgtasis įkvepiamasis tirpalas
beklometazono dipropionatas /
formoterolio fumaratas dihidratas

180 spūsnių 9360196 2501 LT

Įkvėpti, įkvėpdami
laikykite vertikaliai.
Sudėtyje yra fluorintų
šiltnamio efektą
sukeliančių dujų.

STADA

Talpyklėje yra suslėgto tirpalo.
Talpyklės negalima laikyti
aukštesnėje kaip 50 °C
temperatūroje. Talpyklės
negalima pradurti.

Prieš išduodant pacientams.
Laikyti šaldytuve (2–8 °C
temperatūroje) ne ilgiau kaip
18 mėnesių.
Išdavus. Laikyti ne aukštesnėje
kaip 25 °C temperatūroje ne
ilgiau kaip 3 mėnesius.

Vaistinininkams. Lipnioje
pakuotės etiketėje užrašykite
išdavimo pacientui datą ir
užklijuokite ją ant
inhaliatoriaus. Užtikrinkite, kad
nuo išdavimo datos iki
tinkamumo laiko pabaigos,
nurodytos ant pakuotės, būtų ne
mažiau kaip 3 mėnesiai.
Pacientams. Inhaliatoriaus
negalima naudoti praėjus
3 mėnesiams nuo išdavimo datos.

100/6
išdavimo data
...../...../.....

Kiekviename spūsnyje (per
kandiklį išsiskiriančioje dozėje)
yra 100 mikrogramų
beklometazono dipropionato ir
6 mikrogramai formoterolio
fumarato dihidrato. Tai
atitinka įkvėpiamą 84,6
mikrogramų beklometazono
dipropionato ir 5,0 mikrogramų
formoterolio fumarato
dihidrato dozę.
Pagalbinės medžiagos:
ethanolum anhydricum,
acidum hydrochloricum
concentratum, *propelentas*:
norfluratum (HFA-134a).
Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų.
Daugiau informacijos pateikta
pakuotės lapelyje.

Įkvėpti. Prieš vartojimą
perskaitykite pakuotės lapelį.
Įkvėpdami slėginę talpyklę
laikykite vertikaliai.
Skirtas suaugusiems
(18 metų ir vyresniems).
Laikyti vaikams nepastebimoje
ir nepasiekiamoje vietoje.
Receptinis vaistas.

LT/1/24/5646/004

Bedufora

100 mikrogramų/
6 mikrogramai/ 

spūsnyje suslėgtasis
įkvepiamasis tirpalas

beklometazono dipropionatas /
formoterolio fumaratas dihidratas

Talpyklėje su dozės
indikatoriumi yra
180 spūsnių

STADA

STADA Arzneimittel AG
61118 Bad Vilbel
Vokietija

55,5 x 41,5 x 92 mm

9360197
2501
LT