

1 transdermaalne plaaster
1 transdermālais plāksteris
1 transderminis pleistras

Avage siit.
Atvērt šeit.
Atidaryti čia.

matrifen[®]

100 mikrogrammi/tunnis transdermaalne plaaster
100 mikrogrami/stundā transdermāls plāksteris
100 mikrogramu/val. transderminis pleistras

Fentanylum



Transdermaalne
Transdermālai lietošanai
Vartoti per odā

3-BAL
EXP/Lot



Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Üks 33,6 cm² transdermaalne plaaster vabastab fentanüüli 100 mikrogrammi/tunnis 72 tunni jooksul. Ärge kasutage plaastrit, kui pakend on katki. Plaaster tuleb nahale paigaldada koheselt pärast kotikesest eemaldamist. Murdke kasutatud plaaster kokku ja visake ära või tagastage apteeki. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Pirms lietošanas jäizlasa instrukcija. Katrs transdermālais plāksteris ar 33,6 cm² virsmu izdala 100 mikrogramus/stundā fentanila 72 stundu laikā. Nelietojiet plāksteri, ja tas ir bojāts. Plāksteris jāuzliek nekavējoties pēc tā izņemšanas no iepakojuma. Salokiet izlietotos plāksterus un iznīciniet, vai nododiet aptiekā. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Iš kiekvieno 33,6 cm² dydžio transderminio pleistro 100 mikrogramų/val. greičiu fentanilis atsipalaiduoja 72 valandas. Jei maišelis nesandarus, pleistro nevartoti. Iš maišelio išimtą pleistrą būtina klijuoti tuoj pat. Panaudotą pleistrą sulankstyti ir išmesti arba grąžinti į vaistinę. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.