






1 transdermaalne plaaster

1 transdermālais plāksteris

1 transderminis pleistras

Avage siit.
Atvērt šeit.
Atidaryti čia.

matrifēn[®]

75 mikrogrammi/tunnis transdermaalne plaaster

75 mikrogrami/stundā transdermāls plāksteris

75 mikrogrami/val. transderminis pleistras

Fentanylum

Transdermaalne

Transdermālai lietošanai

Vartoti per odā

3-BAL

EXP/Lot

Takeda

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Üks 25,2 cm² transdermaalne plaaster vabastab fentanüüli 75 mikrogrammi/tunnis 72 tunni jooksul. Ärge kasutage plaastrit, kui pakend on katki. Plaaster tuleb nahale paigaldada koheselt pärast kotikesest eemaldamist. Murdke kasutatud plaaster kokku ja visake ära või tagastage apteeki. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Pirms lietošanas jäizlasa instrukcija. Katrs transdermālais plāksteris ar 25,2 cm² virsmu izdala 75 mikrogramus/stundā fentanila 72 stundu laikā. Nelietojiet plāksteri, ja tas ir bojāts. Plāksteris jāuzliek nekavējoties pēc tā izņemšanas no iepakojuma. Salokiet izlietotos plāksterus un iznīciniet, vai nododiet aptiekā. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Prieš vartojimā perskaitykite pakuotės lapelį. Iš kiekvieno 25,2 cm² dydžio transderminio pleistro 75 mikrogramų/val. greičiu fentanilis atsipalaiduoja 72 valandas. Jei maišelis nesandarus, pleistro nevartoti. Iš maišelio išimtą pleistrą būtina klijuoti tuoj pat. Panaudotą pleistrą sulankstyti ir išmesti arba grąžinti į vaistinę. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.