

Ūhukese polūmeerikattega tablett. **Tablettei tohi purustada ega nārīda.**
Enne ravīmī kasutamist lugege pakendī infolehte. Hoida laste eest varjatud ja
kātseamatus kohas. Mitte purustada.
Neelata tablett alla tervelt koos īdaasī veega.
Hoida temperatuurī kuni 30 °C. Sisaldab naatriumi ja naatriumbenzoāti (E211).
Lisateavet vaadake pakendī infolehest.

Plēvele dengtos tabletēs. Vartoti taip, kaip nurodē Jūsų gydytojas. **Tablečių negalima smulkinti ar kramtyti.** Reikia nuryti visą tabletę, užgeriant stikline vandens. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Sudėtyje taip pat yra natrio ir natrio benzoato (E211). Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

SANDOZ

Zinnat 500 mg
tsfuroksīm
cefuroksīmas



7 613421 099107

80X22X130

Zinnat 500 mg

SANDOZ

**ūhukese polūmeerikattega tabletid
plēvele dengtos tabletēs**

**tsfuroksīm
cefuroksīmas**

Ūks ūhukese polūmeerikattega tablett sisaldab 500 mg
tsfuroksīmi tsfuroksīmaksetīlīna.
Kiekvienoje plēvele dengtoje tabletėje yra 500 mg
cefuroksīmo (cefuroksīmo aksetīlo pavidalu).

**14 ūhukese polūmeerikattega tabletti
14 plēvele dengtų tablečių**

Suūkaudine. Retseptiravīm.
Vartoti per burnā. Receptinis vaistas.



Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
Mūūgīlloa nr: 226598

Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
LT/1/94/0478/006

4638724

PC 07818421099107 / Lot / Exp



[illegible]