



Halixol®
15 mg/5 ml sirupas

Seriā
Tinka iki

62110810-12

5 ml sirupo yra 15 mg ambroksolio hidrochlorido.

Pagalbinės medžiagos: natrio citratas, natrio benzoatas, bananų aromatas, žemuogių aromatas, natrio ciklamatas, citrinų rūgštis, povidonas, sorbitolis, išgrynintas vanduo.

Vartoti per burną.

Nereceptinis vaistinis preparatas.

Prieš vartojimą atidžiai perskaityti pakuotės lapelį.

Ispėjimas. Sudėtyje nėra etanolio. Pacientai, sergantys diabetu, taip pat gali vartoti šio preparato, nes jame nėra cukraus, tačiau jiems reikia atsižvelgti į tai, kad 5 ml sirupo yra 1,2 g sorbitolio.

Palengvina atsikosėjimą, esant kvėpavimo sistemos sutrikimams.
Dozavimas. Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams pirmąsias 2-3 dienas gerti po 10 ml sirupo 3 kartus per parą, vėliau – po 10 ml 2 kartus per parą arba po 5 ml 3 kartus per parą.
5-12 metų vaikams gerti po 5 ml 2-3 kartus per parą.
2-5 metų vaikams gerti po 2,5 ml 3 kartus per parą.
Jaunesniems kaip 2 metų vaikams gerti po 2,5 ml 2 kartus per parą.
Sirupo reikia gerti po valgio, gausiai užgeriant skysčiu.

LT/1/98/0826/001



EGIS PHARMACEUTICALS PLC
1106 BUDAPEST, Keresztúri út 30-38
VENGRIJA

Halixol®
15 mg/5 ml sirupas
Ambroksolio
hidrochloridas
Sirupas

100 ml

EGIS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Butelį laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Atidarius butelį, sirupą galima vartoti ne ilgiau kaip 4 savaites.



Halixol[®]

15 mg/5 ml sirupas

Ambroksolio
hidrochloridas

100 ml



5 ml sirupo yra 15 mg ambroksolio hidrochlorido.
Vartoti per burną.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Sudėtyje nėra cukraus ir etanolio.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Butelį laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Atidarius butelį, sirupą galima vartoti ne ilgiau kaip 4 savaites.



EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Serija

Tinka iki

6210850-12