



Vieną kartą per parą.

Vartoti ant odos. Prieš vartojimą
perskaitykite pakuotės lapelį.

Registruotojas:
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austrija



naftifino hidrochloridas

**EXO
DERIL®**

Exoderil® 10 mg/g kremas



GRYBELIO SUKELTŲ ODOS
PAŽEIDIMŲ GYDYMAS

15 g

SANDOZ

naftifino hidrochloridas
**EXO
DERIL®** 15 g kremas



1 g kremo yra 10 mg naftifino hidrochlorido. Kremą tepti ant pažeistos odos vieną kartą per parą. Sudėtyje yra natrio hidroksido, benzilo alkoholio, sorbitano stearato, cetilo palmitato, cetilo alkoholio, stearilo alkoholio, polisorbato 60, izopropilo miristato, išgryninto vandens. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Tinkamumo laikas po pirmojo atidarymo – 4 savaitės, laikant ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Nereceptinis vaistas. LT/1/97/2247/001

40 x 30 x 140
46368159
Code 212

naftifino hidrochloridas

**EXO
DERIL®**

Exoderil® 10 mg/g kremas



GRYBELIO SUKELTŲ ODOS
PAŽEIDIMŲ GYDYMAS

15 g

SANDOZ

Salutas 40 x 30 x 140

Serija
Tinkama



naftifino hidrochloridas

**EXO
DERIL®**

Exoderil® 10 mg/g kremas



GRYBELIO SUKELTŲ ODOS
PAŽEIDIMŲ GYDYMAS

15
g

SANDOZ



Vartoti ant odos.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Tinkamumo laikas po pirmojo atidarymo – 4 savaitės,

laikant ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Tinka iki

Serija

46368157