

Žaizdų, nudegimų ir opų antiseptinis gydymas.

Gydant infekcines ligas žirnio dydžio kiekį pagal poreikį reikia tepti ant pažeistos vietos vieną ar du kartus per parą iki 7 dienų. Tepti nuvalytą, nusausintą pažeistą odą. Ją galima uždengti tvarstiu ar aprišti.

Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

Išspėjimas:

Jei pasireiškia odos dirginimas, kontaktinis dermatitas ar padidėjęs jautrumas, vartojimą reikia nutraukti.

Nesuvartotą vaistą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

Pradeto vartoti tepalo tinkamumo laikas yra 2 metai.

BETADINE®

100 mg/g tepalas

joduotas povidonas

20 g



BETADINE®

100 mg/g tepalas
joduotas povidonas
20 g

Pharmacode

Egis article nr

BETADINE®

100 mg/g tepalas

joduotas povidonas

20 g



LT/1/96/1802/001

iNova UIC code

Lot
EXP.

Pharmacode

1 g tepalo yra **100 mg joduoto povidono**.

Pagalbinės medžiagos: natrio-vandenilio karbonatas, makrogolis 400, makrogolis 4000, makrogolis 1000, makrogolis 1500, išgrynintas vanduo.

Vartoti ant odos.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Nereceptinis vaistas

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.



Egis Pharmaceuticals PLC
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38
Vengrija

38 x 26 x 137 mm

1 : 1

Font size: min. 7,5 pt.

EGIS (povidon jód)

LT

2025.07.09 eml.

Printed colours

CMYK

Pantone 355

Pantone 7629

NOT printed technical colours

die-cut (NOT printed)

technical data (NOT printed)

braille (NOT printed)

area of variable data
(varnish free area)(NOT printed)

Artwork ID: v01

Auguszt Szilvia / 2025.07.21.

