

Dicynone® 250 mg

tabletės

etamsilatas

100 tablečių

SANDOZ

Sandoz d.d.
Verovška 57
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Vartoti per burną.
Kiekvienoje tabletėje yra 250 mg etamsilato.
Sudėtyje yra laktozės monohidrato.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas
nuo šviesos ir drėgmės.
Receptinis vaistas.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje.
LT/1/95/1425/001

Dicynone® 250 mg

tabletės

etamsilatas

SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

Dicynone® 250 mg
tabletes
etamsilatas
SANDOZ

46357905

100