

46 x 21 x 97

Salutas

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

Vienoje kietojoje kapsulėje yra 2 mg loperamido hidrochlorido.

Sudėtyje yra laktozės.

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Jei per 48 valandas viduriavimas nepašalina, nustokite vartoti

Lopedium express ir kreipkitės į gydytoją. Nereceptinis vaistas.

LT/1/97/1229/002

Dozavimas

Ūmaus viduriavimo metu suaugusiems ir vyresniems negu 12 metų paaugliams gerti 2 kapsules. Vėliau po kiekvieno išsituštinimo po 1 kapsulę.



Lot
EXP

46 x 21 x 97
Code
46380509
5011

Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Slovėnija



4 030855 504978

Lopedium[®] express
kietosios kapsulės
2 mg
SANDOZ

Lopedium[®] express 2 mg

kietosios kapsulės

loperamido hidrochloridas

Simptominis ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju,
jei negalima pašalinti viduriavimą sukėlusios priežasties.


10 kietųjų kapsulių

SANDOZ

Lopedium[®] express 2 mg

kietosios kapsulės

SANDOZ



= free space, at least 2 mm

(e.g. text height + free space -> x = 15 mm
4 times x = 4 rows = 60 mm)