




1 ml tirpalo yra 50 mg minoksidilio.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Saugoti, kad nepatektų į akis, ant sudirgintos
odos, gleivinės. Laikyti vaikams nepastebimoje ir
nepasiekiamoje vietoje. Nereceptinis vaistas.
1 ml šķķiduma satur 50 mg minoksidila.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
Izvairities no iekļķšanas acis, kontakta ar bojātu ādu
un gļotādu. Uzglabāt bērniem neredzamā un
nepieejamā vietā. Bezrecepšu zāles.

1 ml nahalahust sisaldab 50 mg minoksidili.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi
infolehte. Vältida ravimi sattumist silma,
suhu ja nahavigastustele. Hoida laste eest
varjatud ja kättesaamatus kohas. Kāsimūģiravim.

McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Airton Road, Tallaght, Dublin 24
Airija/ Irija/ Iirimaa

McNeil
Healthcare (Ireland) Ltd.

Serijs/
Sēr. Nr.:/
Partii nr.:
Tinka iki /
Derīģis līdz: /
Kolblik kuni:

E S 0 0 1 2 2



LT/1/96/2446/002
Reg. nr.: 00-0480
Mūģģģģģģģģģģ nr: 276699

Regaine®

50 mg/ml

odos tirpalas/
uz ādas lietojams šķķidums/
nahalahus

Minoxidilum

Vartoti ant odos.
Lietošanai uz ādas.
Kutaanne.

60 ml