
IBUSTAR®
40 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams
ibuprofenas
100 ml
geriamosios suspensijos
40 mg/ml
Vaikams, sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiesiems.
Pakuotėje yra geriamasis švirkštas.
BERLIN-CHEMIE MENARINI
Trumpalaikiam lengvo arba vidutinio stiprumo skausmo ir (ar) karščiavimo simptominiam gydymui.
Rekomenduojama dozė yra:
Kūno masė (amžius)
Vienkartinė dozė
Didžiausia paros dozė (24 valandos)
10–15 kg (6–11 mėnesių vaikai)
2,5 ml geriamosios suspensijos (atitinka 100 mg ibuprofeno)
7,5 ml geriamosios suspensijos (atitinka 300 mg ibuprofeno)
16–19 kg (4–6 metų vaikai)
3,75 ml geriamosios suspensijos (atitinka 150 mg ibuprofeno)
11,25 ml geriamosios suspensijos (atitinka 450 mg ibuprofeno)
20–29 kg (6–9 metų vaikai)
5 ml suspensijos (atitinka 200 mg ibuprofeno)
15 ml geriamosios suspensijos (atitinka 600 mg ibuprofeno)
30–39 kg (10–11 metų vaikai)
5 ml geriamosios suspensijos (atitinka 200 mg ibuprofeno)
20 ml geriamosios suspensijos (atitinka 800 mg ibuprofeno)
≥ 40 kg (paaugliai nuo 12 metų ir suaugusieji)
5 ml–10 ml geriamosios suspensijos (atitinka 200 mg–400 mg ibuprofeno)
30 ml geriamosios suspensijos (ir atitinka 1 200 mg ibuprofeno)
Prieš vartojimą buteliukas pakratyti. Dozavimui naudoti geriamąjį švirkštą.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
1 ml yra 40 mg ibuprofeno.
Vartoti per burną.
Geriamoji suspensija
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nematomoje vietoje.
Naroxcapsius vaistas
BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Vokietija
LT/1/15/1529/002
Tinka iki
Serija
V155895/01
LT
varnish free

100 ml
geriamosios suspensijos

IBUSTAR®

40 mg/ml geriamoji suspensija,

vaikams

ibuprofenas



Vaikams, sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiesiems.

V155896/01

Trumpalaikiam lengvo arba vidutinio stiprumo skausmo ir (ar) karščiavimo simptominiam gydymui.

1 ml yra 40 mg ibuprofeno. Sudėtyje yra skystojo maltitolio (E 965), natrio, natrio benzoato (E 211) ir benzilo alkoholio. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Geriamoji suspensija · Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. **Prieš vartojimą butelіuką pakratyti**. Dozavimui naudoti geriamąjį švirkštą. Nereceptinis vaistas.

Tinkamumo laikas pirmą kartą atidarius:
6 mėnesiai, jei laikoma žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125,
12489 Berlin, Vokietija

LT/1/15/3829/002

BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Atidarymo data

Serija
Tinka iki

varnish free