Kiekvienoje dozėje (0,5 ml) yra:
Inaktyvuotų 1-ojo tipo poliovirusų (Mahoney)[1]. . . . . 40 D antigeno vienetų[2,3]
Inaktyvuotų 2-ojo tipo poliovirusų (MEF-1)[1] . . . . . 8 D antigeno vienetai[2,3]
Inaktyvuotų 3-iojo poliovirusų (Saukett)[1] . . . . . 32 D antigeno vienetai[2,3]

[1] Kultivuotų VERO ląstelių kultūroje
[2] Antigeno kiekis galutiniame produkte pagal PSO rekomendacijas
[3] Arba ekvivalentiškas nominalus kiekvieno tipo poliovirusų kiekis, išreikštas D antigeno Europos farmakopėjos vienetais.

Pagalbinės medžiagos:
fenoksieanolis, etanolis, formaldehidas, *Hanks 199* terpė be fenolio raudonojo (aminorūgščių, įskaitant ir fenilalaniną, mineralinių druskų, vitaminų ir kitų komponentų, įskaitant ir gliukozę, sudėtinis mišinys, papildytas polisorbatu 80 ir atskiestas injekciniu vandeniu), vandenilio chlorido rūgštis arba natrio hidroksidas (pH sureguliuoti).

IMOVAX POLIO injekcinė suspensija

Vakcina nuo poliomielito (inaktyvuota)

1 užpildytas švirkštas su adata
0,5 ml - 1 dozė
Leisti į raumenis arba po oda

SANOFI PASTEUR

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Laikyti šaldytuve (2°C–8°C).
Švirkštą laikyti išorinėje dėžtėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Negalima užšaldyti.
Nesuvartotą vakciną ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

Receptinis vaistas.

N1 - LT/1/95/1349/001

MANUF / LOT / EXP / SN / PC

Registruotojas:
SANOFI PASTEUR
14 Espace Henry Vallée
69007 LYON
Prancūzija

707125 - HU

25,5x24x100 mm

Bon à Tirer
LMA
SANOFI PASTEUR SA

IMOVAX POLIO

VACCIN POLIOMYÉLITIQUE (INACTIVÉ)/POLIOMYELITIS VACCINE (INACTIVATED)/ VACUNA ANTIPOLIOMIELITÍCA (INACTIVADA)

0,5 ml - 1 dose/dosis

Voie IM ou SC / IM or SC route / Vía IM o SC

Sanofi Pasteur

Manuf. :

Lot :

Exp.

059 943930