

Zapis w systemie Braille'a /
Braille inscriptions



PUDEŁKO ZAWIERA NAKLEJKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ/
BOX WITH SAFETY STICKER

Materiał / Material:	**PUDEŁKO Z NADRUKIEM / BOX WITH OVERPRINT**								
Wzór / Artwork:	**KRVR-0048-800_2 (70x25x104 mm)**					Kolorystyka i uwagi/ Colours and comments	C M Y K P 2747 C		
Preparat / Product:	**Mibrex 15 mg x 28 tabl.powl.**								
Min. Rozmiar czcionki/ Min. font size:	**7 p**	Interlinia/ Interline spacing:	**3 mm**	Farmakod/ Pharmacode:	**293**	Format strony/ Page format:	**A3**	Opracował/ Prepared by:	29.09.2025 A.Waszak

PACIENTO BUDRUMO KORTELĖ

Mibrex®

☐2,5 mg ☐10 mg ☐15 mg ☐20 mg

(paskirtą dozę pažymėti varnele)

VISADA TURĖKITE ŠIĄ KORTELĘ.

• Parodykite šią kortelę kiekvienam gydytojui arba odontologui prieš paskiriant Jums gydymą.

Miejsce naniesienia kodu QR zawierające adres https://polpharma.pl/int/lt/phv/ oraz numer wewnętrzy drukarni

Aš vartoju antikoaguliantą Mibrex (rivaroksabaną)

Vardas, pavardė: _____

Adresas: _____

_____

Gimimo data: _____ Svoris: _____

Kiti vaistai / būklės: _____

_____

Skubos atveju praneškite:

Gydytojo v., pavardė: _____

Gydytojo tel.: _____

Gydytojo antspaudas:

Taip pat praneškite:

Vardas, pavardė: _____

Telefonas: _____

Giminystės ryšys: _____

Informacija sveikatos priežiūros specialistams:

• TNS reikšmių nustatyti nereikia, nes tai nėra patikimas tyrimo metodas Mibrex antikoaguliaciniam aktyvumui įvertinti.

V 1.0_06.2023_LT

KRVR-0048-800

Ką turėčiau žinoti apie Mibrex?

- Mibrex suskystina kraują, o tai apsaugo nuo pavojingų kraujo krešulių susidarymo.
- Mibrex reikia vartoti tiksliai kaip nurodė gydytojas. Kad geriausiai apsisaugotumėte nuo kraujo krešulių susidarymo, **niekada nepraleiskite dozes.**
- Negalima nustoti vartoti Mibrex prieš tai nepasitarus su gydytoju, nes gali padidėti kraujo krešulių susidarymo rizika.
- Jeigu vartojate, neseniai vartojote ar ketinate pradėti vartoti kitų vaistų, prieš pradėdami vartoti Mibrex apie tai pasakykite savo sveikatos priežiūros specialistui.
- Prieš atliekant bet kokią chirurginę ar invazinę procedūrą, savo sveikatos priežiūros specialistui pasakykite, kad vartojate Mibrex.

Kada turėčiau kreiptis į savo sveikatos priežiūros specialistą?

Vartojant kraują skystinantį vaistą Mibrex, svarbu žinoti, koks yra jo šalutinis poveikis. Dažniausias šalutinis poveikis yra kraujavimas. Jei žinote, kad Jums yra kraujavimo rizika, negalima pradėti vartoti
Mibrex, prieš tai nepasitarus su gydytoju. Nedelsdami pasakykite savo sveikatos priežiūros specialistui, jeigu pasireiškia tokie kraujavimo požymiai arba simptomai:

- skausmas
- tinimas arba nemalonus jausmas
- galvos skausmas, svaigulys arba silpnumas
- neįprastos mėlynės, kraujavimas iš nosies, kraujavimas iš dantenų, ilgai nepraeinantis kraujavimas įsipjovus
- gausesnis nei įprastai mėnesinių kraujavimas arba kraujavimas iš makšties
- kraujas šlapime, kuris gali būti rausvos arba rudos spalvos, raudonos arba juodos spalvos išmatos
- kraujo atkosėjimas arba vėmimas krauju ar į kavos tirščius panašiu skrandžio turiniu.

Kaip vartoti Mibrex?

- Norint užtikrinti optimalią apsaugą, Mibrex
  - 2,5 mg tabletes galima vartoti valgio metu arba nevalgius;
  - 10 mg tabletes galima vartoti valgio metu arba nevalgius;

15 mg tabletes reikia vartoti valgio metu;

20 mg tabletes reikia vartoti valgio metu.

2023 m. rugsėjo mėn.

Materiał / Material:	KARTA PACJENTA / PATIENT ALERT CARD							
Wzór / Artwork:	KRVR-0048-800_2 (39x80 mm)				Kolorystyka i uwagi/ Colours and comments	■K		
Preparat / Product:	Mibrex 15 mg x 28 tabl.powl.							
Min. Rozmiar czcionki/ Min. font size:	7 p	Interlinia/ Interline spacing:	3 mm	Farmakod/ Pharmacode:	-	Format strony/ Page format:	A3	Opracował/ Prepared by: 29.09.2025 A.Waszak