
EXP
Lot
59 x 59 x 120 mm
ACC
20 mg/ml
suukaudne lahus
acetylcysteinum
Sekreedi veeldamine ja röga lahtistamine bronhiidi korral lastel alates 2 aasta vanusest, noorukitel ja täiskasvanutel.
100 ml suukaudset lahust
SANDOZ
EE Täiskasvanutele, noorukitele ja lastele alates 2 aasta vanusest.
1 ml suukaudset lahust sisaldab 20 mg atsetüültsüsteiini. Sisaldab metüülparahüdroksübensoaati (E218), naatriumbensoaati, naatriumi ja bensüülalkoholi. Lisateavet vt pakendi infolehelt. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Suukaudne. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Pärast esmast avamist: hoida temperatuuril kuni 25 °C. Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmast avamist: 15 päeva.
Käsimüügiravim.
Müügiloa nr: 836414
Suusüstal
Määratops
Vanus
Ööpäevane annus
Lapsed vanuses 2...5 aastat
5 ml 2...3 korda ööpäevas
Lapsed ja noorukid vanuses 6...14 aastat
10 ml 2 korda ööpäevas
Täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid
10 ml 2...3 korda ööpäevas
Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Slovénija / Sloveenia
50109335
2475
LT Suaugusiesiems, paaugliams ir vyresniems kaip 2 metų amžiaus vaikams. Kiekviename mililitre geriamojo tirpalo yra 20 mg acetilcisteino. Sudėtyje yra: methylis parahydroxybenzoas (E218), natrii benzoas, natrium et alcohol benzylicus. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje. Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Tinkamumo laikas po buteliuko pirmojo atidarymo: 15 dienų. Laikymo sąlygos po buteliuko pirmojo atidarymo: laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Nereceptinis vaistas.
LT/1/14/3507/001
Matavimo taurelė ir geriamasis švirkštas
Amžius
Paros dozė
2 - 5 metų vaikai
5 ml 2 - 3 kartus per parą
6 - 14 metų vaikai ir paaugliai
10 ml 2 kartus per parą
Suaugusieji ir vyresni kaip 14 metų paaugliai
10 ml 2 - 3 kartus per parą
4 030855 501281
ACC
20 mg/ml
acetylcysteinum
SANDOZ
ACC
20 mg/ml
geriamasis tirpalas
acetylcysteinum
Gleivių skystinimas ir atsikosėjimo lengvinimas peršalimo sukelto bronchito atveju vyresniems kaip 2 metų vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems.
100 ml geriamojo tirpalo
SANDOZ
40022115-ELT

50109336 2476 40129051

ACC 20 mg/ml

acetylcysteinum

geriamasis tirpalas / suukaudne lahus

LT Suaugusiesiems, paaugliams ir vyresniems kaip 2 metų amžiaus vaikams. Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Po pirmojo atidarymo: laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Tinka vartoti 15 dienų.

EE Täiskasvanutele, noorukitele ja lastele alates 2 aasta vanusest. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne. Pärast esmast avamist: hoida temperatuuril kuni 25°C. Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 15 päeva.

SANDOZ

100 ml

geriamojo tirpalo / suukaudset lahust

EXP

Lot