CIT005-01 - 30 x 30 x 118 mm – DRA_90260

78

No varnish

Doloproct® 1 mg/20 mg/g
tiesiosios žarnos kremas
Fluocortoloni pivalas/Lidocaini hydrochloridum
vartoti į tiesiąją žarną
15 g

No varnish

78

1 g rektaalkreemi sisaldab 1 mg fluokortoloonpivalaati ja 20 mg lidokaiinvesinikkloriidi (Veevaba). Sisaldab aplikaatsibonioitsikut. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud jalkatteaamatus kohas. Pärast tuubi esmast avamist võib kreemi kasutada 4 nädalat. Retseptiravim.

1 g tiesiosios žarnos kremo yra 1 mg fluokortolono pivalato ir 20 mg lidokaino hidrochlorido (bevandenio). Kiekvienoje pakuotėje yra aplikatorius. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Pirmą kartą atidarius tūbelę, tiesiosios žarnos kremą galima vartoti 4 savaites. Receptinis vaistas.

1 g rektālā krēma satur 1 mg fluokortolona pivalāta un 20 mg lidokaīna hidrohlorīda (bezūdens). Iepakojumam pievienots aplikācijas uzgalis. Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Pēc iepakojuma pirmās atvēršanas rektālo krēmu var lietot 4 nedēļas. Recepšu zāles.

063347

86892677

No varnish
Place for SN and data Matrix

PC: 05702191023855

Doloproct® 1 mg/20 mg/g
rektaalkreem/rektālais krēms
Fluocortoloni pivalas/Lidocaini hydrochloridum
rektaalne/ rektālai lietošanai
15 g

Lot:
EXP:

No varnish

Pagalbinės medžiagos/palīgvielas/abiained: polysorbatum 60, sorbitani stearas, alcohol cetylicus et stearylicus, paraffinum liquidum, vaselinum album, dinatrii edetas, natrii dihydrogenophosphas dihydricus, dinatrii phosphas dodecahydricus, alcohol benzylicus, aqua purificata.
Satur cetostearilspirtu.

LT/1/05/0380/003 - LV 05-0259 - EE 479105

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Danija/Dānija/Taani

5 702191 023855

CIT005-01
30 x 30 x 118 mm

Keyline

No varnish

Perforation

TAIT003-00 - Ø:19 mm / 59,7 x 105 mm – DRA_90066

Doloproct® 1 mg/20 mg/g tiesiosios žarnos kremas/ rektālais krēms/ rektaalkreem

Fluocortoloni pivalas/Lidocaini hydrochloridum

Vartoti į tiesiąją žarną/rektālai lietošanai/rektaalne

15 g

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Pirmą kartą atidarius tūbelę, tiesiosios žarnos kremą galima vartoti 4 savaites.

Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju.
Pēc iepakojuma pirmās atvēršanas rektālo krēmu var lietot 4 nedēļas.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Pärast tuubi esmast avamist võib kreemi kasutada 4 nädalat.

LEO

063288/868892642

Lot/EXP:

101